



Nattschema & information

TILL PATIENTER SOM FÅR
MINIRIN FRYSTORKAD TABLETT



Minirin[®]
DESMOPRESSIN SMÄLTABLETT
60/120/240µg



MINIRIN® (desmopressin) 120/240 µg frystorkad tablett

- Smälter snabbt under tungan.
- Ingen vätska behövs.
- Bra även för de som tycker att det är svårt eller obehagligt att svälja vanliga tabletter.
- MINIRIN 120/240 µg frystorkad tablett är spröd och kan inte tryckas genom folien utan ska tas ut genom att folien först dras av.
- Vid behandling med MINIRIN ska vätskeintaget begränsas. 1 timme före fram till 8 timmar efter det att man har tagit tablettens ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga.

Vill du beställa nya block?
Se under sista bladet!



Dagråd

Tänk på att dina dagvanor påverkar din förmåga att vara torr på natten.

- Kissa på regelbundna tider samt alltid innan du skall vara utomhus en längre stund eller har svårt att komma åt en toalett. Kissa då även om du inte känner dig kissnödig.
- Kissa alltid direkt då du stigit upp på morgonen och just innan du går till sängs på kvällen.
- Skjut aldrig upp toalettbesök när du är bajsnödig.
- Glöm inte att dricka regelbundet under dagen men drick sparsamt på kvällen.

Nattschema

Fyll i nedanstående schema över MINIRIN-behandlingens effekt och **ta med** till din läkare/sjuksköterska/uroterapeut vid återbesök!

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag
V E C K A 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V E C K A 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V E C K A 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V E C K A 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V E C K A 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T = torrt v = vått (stort V – stor mängd, litet v – liten mängd)

Namn..... Personnr.....



Information om MINIRIN® (desmopressin) 120/240 µg frystorkad tablett

Vi ber dig att läsa igenom informationsbladet, innan du påbörjar din behandling med Minirin.

Observera att den inte ersätter bipacksedeln, som också bör läsas.

MINIRIN 120/240 µg frystorkad tablett är speciellt utvecklad för att smälta snabbt under tungan, även kallad smältablett.



En fördel med denna egenskap är att tablettens är lätt att ta utan vätska.

Vid behandling med MINIRIN ska vätskeintaget begränsas. 1 timme före fram till 8 timmar efter det att man har tagit smältabletten ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga.

MINIRIN smältablett är spröd och kan därför inte tryckas genom folien. Ta istället ut tablettens ur kartan genom att dra av aluminiumhöljet.

Öppningsinstruktioner

1. Börja med att ta bort ytterkanten som är markerad med en hand.
2. Riv därefter av en tablett längs med perforeringen.
3. Dra därefter av folien med start i det markerade hörnet. Tag sedan ut tablettens och lägg den under tungan.



Tänk på att alltid förvara läkemedel utom räckhåll för små barn. MINIRIN smältablett är fukt känslig och ska alltid förvaras i originalförpackningen.

Övrigt:.....

.....



Ferring Läkemedel AB

Svarspost

20 14 23 27

203 10 Malmö

Är dina block slut?
Fyll i och returnera så
kommer det nya!



Ja tack!

Jag vill gärna att ni skickar st
patientblock till mig

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Minirin® (desmopressin) – frystorkade tabletter 60 µg, 120 µg och 240 µg. **Indikationer:** Primär nattlig enures (fr om 6 års ålder) när enureslarm inte givit önskad effekt hos patienter med normal förmåga att koncentrera urin. **Dosering:** Dosen av Minirin anpassas individuellt. En lämplig initialdos är 120 µg sublingualt till natten. Dosen kan ökas upp till 240 µg sublingualt om den lägre dosen inte är tillräckligt effektiv. Vätskerestriktion ska iakttas. Om tecken eller symptom på vattenretention och/eller hyponatremi uppkommer, bör behandlingen avbrytas till patienten återhämtat sig helt. Strikta vätskerestriktioner är nödvändiga när behandlingen sedan återupptas. **Kontraindikationer:** Habituell eller psykogent betingad polydipsi (dygnsurinvolym över 40 ml/kg), känd eller misstänkt hjärtinkompensation och andra tillstånd som kräver behandling med diuretika, måttlig till svår njurinsufficiens (kreatininclearance mindre än 50 ml/min), syndrom med störd ADH-sekretion (SIADH), känd hyponatremi, överkänslighet mot desmopressin eller mot något av hjälpämnen. **Varningar och försiktighet:** Vid behandling av primär nattlig enures, ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga under perioden 1 timme före till 8 timmar efter administrering. Utan samtidig minskning av vätskeintaget, kan behandlingen leda till vattenretention och/eller hyponatremi (huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper). Behandling med desmopressin bör avbrytas vid akuta sjukdomar med rubbad vätske- och/eller elektrolytbalans som vid systeminfektioner, feber och gastroenterit. **Förpackningar:** Aluminium/aluminium blister à 10 frystorkade tabletter. **Förpackningsstorlekar:** 60 µg: 30 och 100 st. 120 µg: 30 och 100 st. 240 µg: 30 och 100 st. ATC-kod: H01BA02. Rx. F. SPC uppdaterad: 2013-11-15. För ytterligare information och pris se fass.se.



Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se